

Снижение уровня личности (осевой синдром)

Каждый признак обязателен, но недостаточен!

Снижение энергетического потенциала

- «Лень» в первую очередь она распространяется на умственный труд, в то время как физические нагрузки могут даже ненадолго активизировать интеллект больного. Жалобы на быструю утомляемость, плохую память, раздражительность, нарушение сна, ухудшается активное внимание.
- Возможен вариант внезапного и мало мотивированного интереса к изучению религиозной, философской или иной литературы, однако пациент ничего не усваивает.

Остановка онтогенетического развития личности

- в первую очередь затрагивает профессиональную сферу деятельности пациентов, иногда в сфере профессиональной деятельности резко изменяется ее направленность.
- Исчезает возможность приобретать новые для личности морально-этические и культурные знания и навыки.

Нарушение социальных контактов.

- При вялотекущей шизофрении отмечается перинуклеарный тип нарушения контактов. Пациенты перестают приобретать новых знакомых, потом отторгаются приятели и друзья, в далеко зашедших случаях больные избегают общения даже с близкими и родными.
- При злокачественных формах шизофрении отмечается нуклеарный характер нарушения контактов, чаще всего он предшествует манифестации психоза. В один из пубертатных кризов, чаще – в третьем, больные начинают отторгать от себя наиболее близких людей – мать, отца, уходят из дома, попадают в делинквентные компании.
- Возможен и так называемый «аутизм наизнанку», вариант, при котором больные демонстрируют огромное количество социальных контактов, однако эти контакты