

Шизофрения с непрерывным течением

Вялотекущая непрерывная шизофрения

- Начало заболевания медленное, постепенное.
- На ранних этапах течения болезни преобладают невротоподобные проявления. Из них чаще всего наблюдаются различные навязчивые расстройства. Ритуалы чрезвычайно причудливы, фобии быстро утрачивают эмоциональный оттенок, страхи сами по себе часто нелепы. Постепенно нарастает вялость, утомляемость при отсутствии заметных физических нагрузок, суживается круг интересов, утрачивается активность.
- Ипохондрически-сенестопатические жалобы больных вялотекущей шизофренией отличаются особой вычурностью.
- Возможно развитие деперсонализационных расстройств с усложнением от невротических явлений «пронзительного самоанализа» до ощущения отсутствия всех естественных проявлений своего «Я» (у меня нет своих эмоций, своих чувств, своего настроения). Дерезализация проявляется в ощущении «неясности окружающего». Эпизодически могут появляться ощущения утраты чёткости мышления, управления мыслями, но эти симптомы транзиторны, на первый план выступают невротоподобные расстройства.
- Встречаются проявления дисморфофобии и дисморфомании. Мотивы голодания или строгой диеты могут быть совершенно невразумительными, проявления анорексии могут проявляться не полным отказом от пищи, а вычурными, заумными голодными диетами. мысли о своём уродстве касаются, как правило, тех частей тела, которые являются нормальными, а реальные дефекты игнорируются полностью.
- **Психопатоподобные расстройства** могут выражаться в неожиданном появлении грубых истерических реакций, не связанных с какими-либо психогенными факторами.
- Из-за нарушения концентрации мыслей и несобранности падает успеваемость и трудоспособность. Нарастает аутизм, больные погружаются в мир собственных фантазий, которые характеризуются нелепостью и вычурностью
- Больные психопатоподобной шизофренией на разных этапах болезни обнаруживают склонность к употреблению алкоголя, наркотиков, что указывает на известное ослабление волевых функций. Алкоголизация (наркотизация) может у них спонтанно прекращаться с нарастанием общего психического оскудения, аутизации, самоизоляции.